À la mi-juin un jeune incapable de voler est récupéré par la propriétaire des lieux dans un poulailler à Amancy, il s'agit d'un jeune issu de reproduction hors nichoir. Mi-juillet, un adulte est pris dans les serres d'une buse variable puis lâché à Sales. L'oiseau a été récupéré, non blessé mais choqué, puis relâché le soir au niveau du nichoir dont il dépend.

• **Isère (38)**
Depuis plusieurs années, le groupe Chevêche isérois est constitué de 4 équipes locales. En 2011, 17 bénévoles ont suivi les 105 nichoirs (dont 42 au sud de Grenoble, 32 en Bièvre Valloire, 22 dans le Grésivaudan et 9 dans le Voironnais). Ainsi, 13 nichoirs ont été utilisés par la chevêche pour nidifier et 16 autres comme gîte diurne ou garde-manger. 2 nichoirs ont été « squatté » par des petits-ducs scops et 1 par une huppe fasciée. En effet, on constate un intérêt nouveau du petit duc pour nos nichoirs dû sans doute à l'évolution positive de sa population en Isère. En 2012, la pose de nichoir devrait se poursuivre, avec un effort de prospection des mâles chanteurs plus important.

Coordination : Marie RACATE (LPO Isère)

• **Rhône (69)**
Cette année, dans le Rhône, les populations n'ont été suivies que sur les 2 secteurs d'étude principaux et non sur des petits secteurs de sondage comme l'an passé.
Dans le secteur des Coteaux du Lyonnais à 30 km au nord-ouest de Lyon (30 km²), le nombre de mâles chanteurs, de 43 stable depuis 3 ans, a "explosé" en 2011 pour atteindre 60 ! Est-ce l'effet d'une météo exceptionnelle que nous avons eu pour les 2 séances de repasse en avril, ou bien l'effet de la protection depuis 2007 qui se fait enfin sentir ? Certains secteurs, désertés depuis 2007, ont en effet été reconquis cette année. Sur les 27 nichoirs posés en 2008 et 2009, 11 ont été occupés avec reproduction dans 8 d'entre eux (30%). 4 nichoirs supplémentaires ont été posés, ainsi que des essais d'échappatoires anti-noyade dans quelques abreuvoirs, mais peu convaincant quant à leur résistance face aux vaches !
Par contre, dans le secteur du Plateau Mornantais à 20 km au sud-ouest de Lyon (25 km²) le nombre de mâles chanteurs continue de décroître, de 63 en 2009 à 35 en 2010, et seulement de 24 en 2011, même si un maximum de 30 est possible mais non confirmé. La météo a été toutefois moins favorable en mars qu'elle n'a été en avril. Cette diminution est très préoccupante. La campagne de pose de nichoirs proposée pour 2011 n'a pu être menée, elle sera réalisée en 2012 avec si possible une campagne de restauration du biotope, comme des plantations de saules ou autres arbres têtards.

Coordination : Christian MALIVERNEY (LNR et LPO Rhône)

• **Savoie (73)**
Sur notre zone de suivi (30 km²), le nombre de mâles chanteurs continue de baisser. La recherche sur le département s'est poursuivie dans les secteurs de St-Pierre-d'Albigny et de Coise. Un seul contact pour 17 km² prospectés. Lors d'animations scolaires, la FRAPNA Savoie a posé à St Baldoph un nichoir près des écoles. Depuis, celui-ci est occupé et suivi par les enfants de la commune.

Coordination : Jérôme HARENT

Chevêchette d'Europe et Chouette de Tengmalm

Glaucidium passerinum & Aegolius funereus

Cette cinquième synthèse du suivi des "Petites chouettes de montagne" concerne 22 secteurs géographiques de présence de l'une ou des deux espèces.
Afin de mieux prendre en compte la biologie des 2 espèces, les données s'arrêteront dorénavant chaque année à la période estivale. Comme l'automne 2010 a été pris en compte dans le précédent rapport, celui-ci n'intègre que la saison de reproduction 2011.
Plus de 300 personnes ont participé à ce suivi en 2011 et ont totalisé l'équivalent de plus de 1000 journées de prospection sur le terrain. Malgré les progrès, il reste des zones peu ou mal couvertes, des secteurs où notre connaissance de la répartition et de la nidification des deux espèces est insuffisante. Toute contribution sera la bienvenue.
*Après une excellente année 2010 (250 chanteurs ou couples), la **chouette de Tengmalm** est en régression (163 territoires occupés dont 28 avec preuves de nidification). Elle est revenue au niveau des années antérieures (115 à 130 territoires entre 2007 et 2009).*
*L'année 2011 a été bien meilleure que les années précédentes pour la **chevêchette d'Europe** : 228 territoires ont été repérés cette année (un record !) contre 110 l'année passée, 89 en 2009, 81 en 2008 et 38 en 2007. Parmi ceux-ci, 17 nids ont été découverts en 2011 et une famille a été observée peu après l'envol de la nichée.*
Ainsi, pour la première fois depuis le début de ce suivi des petites chouettes de montagne, la chevêchette devance la Tengmalm ! Est ce la conséquence de recherches plus poussées concernant la chouette pygmée, d'un dynamisme nouveau de cette espèce ou d'une régression marquée de la chouette de Tengmalm ? Seule la poursuite de ces suivis passionnants nous permettra de répondre à cette question.

Yves MULLER

Chevêchette d'Europe : espèce rare

Chouette de Tengmalm : espèce à surveiller

ARDENNES

Alors qu'en 2009 et 2010, aucune donnée n'avait été enregistrée sur la chouette de Tengmalm dans les Ardennes françaises, l'année 2011 a constitué une année record : 17 territoires ont été localisés lors des prospections menées en vue de la rédaction du DOCOB de la ZPS du plateau ardennais et 2 nids ont été découverts ! Ces résultats ont aussi été influencés par la forte présence de rongeurs en forêt.

Coordination : Nicolas HARTER (Association ReNArd)

MASSIF VOSGIEN

• Vosges du Nord (57-67)

Seuls deux chanteurs de chouette de Tengmalm ont été contrôlés dans les Vosges du Nord au printemps 2011. Sur un des sites, la nidification est possible (un oiseau vu dans une loge). Plus de 200 cavités de pic noir ont été contrôlées en vain par grattage…
Sept territoires de chevêchette d'Europe sont occupés au printemps par des chanteurs ou des couples dans le Pays de Bitche et la proche Alsace, et un dans le secteur de La Petite-Pierre. Sur ces sites, 2 nids de chevêchette d'Europe ont été découverts et suivis précisément aux confins de l'Alsace et de la Lorraine, près de l'Allemagne (8e et 9e preuve de nidification de l'espèce à basse altitude dans les Vosges du Nord depuis 2002).

• Vosges moyennes (57-67)

Trois chanteurs (ou couples) de chouette de Tengmalm ont été contrôlés ce printemps sans preuve de nidification et, sur deux autres sites, un adulte a été observé dans une loge.
La chevêchette d'Europe (dont la 1è preuve de nidification avait été obtenue en 2009) a été retrouvée au printemps 2011 sur 2 sites (des chants jusqu'à mi-avril).

• Hautes-Vosges (68-88)

La chouette de Tengmalm est en nette régression en 2011 dans les Hautes-Vosges : un nid (oiseau dans une loge) et 6 chanteurs.
En revanche, grâce à des prospections plus complètes, 16 chanteurs de chevêchette ont été repérés, essentiellement du côté lorrain de ce vaste secteur (un chanteur tout de même dans les Hautes-Vosges alsaciennes).

Coordination : Yves MULLER (LPO Alsace)

MASSIF JURASSIEN

• Alsace (68)

Un chanteur de chouette de Tengmalm a été entendu durant 4 soirées consécutives du 22 au 25 mai dans le Jura alsacien.

• Franche-Comté (25-39)

Seulement 34 observations de chouette de Tengmalm ont été transmises pour l'année 2011 en Franche-Comté, soit 4 fois moins qu'en 2010. Ces observations se répartissent sur 14 communes du département du Jura et 5 communes du département du Doubs. La majorité des observations a été faite dans l'aire de répartition traditionnelle, au-delà de 1 000 m d'altitude. Cependant 5 chanteurs ont été contactés en-dessous de 900 m dont deux vers 600 m d'altitude. Comme les 3 années précédentes, aucune observation n'a été transmise en provenance de la partie franc-comtoise des Vosges malgré des prospections. Seuls 15 chanteurs ont été détectés et un seul cas de reproduction répertorié, dans une loge de pic noir. Alors que l'année 2010 avait été une année relativement plus propice avec au moins 102 chanteurs entendus, l'année 2011 revient aux faibles niveaux de 2008 (13 chanteurs) et 2009 (17 chanteurs).
Durant le premier semestre 2011, 37 observations de chevêchette d'Europe ont été transmises soit relativement plus que les années précédentes sur la même période. Une nouvelle fois, toutes les observations ont été faites au sud de Morteau et aucune donnée n'a été répertoriée dans la partie franc-comtoise des Vosges malgré des prospections. Des individus ont été contactés dans 14 communes du département du Jura et 5 communes du département du Doubs, au-dessus de 950 m d'altitude à l'exception d'un site à 780 m où 2 chanteurs ont été détectés. Avec 24 chanteurs, l'effectif reste stable en 2011 (de 24 à 28 chanteurs entre 2007 et 2009). Un seul cas de reproduction a été rapporté avec 2 jeunes le 11 juillet.

Coordination : Michel GAUTHIER-CLERC (LPO Franche-Comté)

• Ain (01)

Trois chanteurs de chouette de Tengmalm ont été repérés cette année. Le contrôle des arbres percés par le pic noir (une quarantaine de hêtres situés entre 800 m et 1 400 m d'altitude) n'a pas permis de trouver le nid de cette espèce cette année.
Au nord de la Haute-Chaîne du Jura, 7 mâles chanteurs de chevêchette d'Europe sont distants en moyenne de 1,5 km les uns des autres. Ils sont situés au-dessus de 1 300 m d'altitude, dans des forêts résineuses (mélangées de feuillus) peu denses. Des clairières, constituées de pâturages boisés ou de trouées forestières, sont toujours présentes et utilisées pour la chasse.
Prospecté depuis une année, le secteur du Retord donne des résultats prometteurs. L'espèce est présente sur plusieurs sites et la répartition assez homogène dans les habitats favorables.

Coordination : Gérard PONTHUS (ONF)

BOURGOGNE

Les secteurs favorables de Côte-d'Or et du Morvan ont été prospectés assidûment comme chaque année (20 soirées d'écoute). Aucun chanteur de chouette de Tengmalm n'a été contacté et aucune nidification n'a été découverte en 2011 !

Coordination : Hervé JACOB

MASSIF CENTRAL

• Massifs forestiers de la Loire (42)

173 points d'écoute ont été réalisés dans l'ensemble des massifs du département : 11 soirées dans les monts du Forez plus 3 visites de loges et nichoirs, 23 soirées pour les monts de la Madeleine / bois noirs et une pour le Pilat.
Résultats : les monts du Forez totalisent 2 mâles chanteurs de chouette de Tengmalm, ainsi que 2 indices de présence par des cris, les monts de la Madeleine 1 mâle chanteur et 4 indices de présence par des cris et des survols silencieux. Dans le Pilat, aucune donnée n'a été enregistrée cette année.
Aucune donnée de chevêchette d'Europe à ce jour pour ce département.

Coordination : Rodolphe GENOUILHAC (LPO Loire)

• Chaîne des Puys (63)

Une petite année pour la chouette de Tengmalm dans la Chaîne des Puys : 2 mâles chanteurs et aucune loge occupée ! Le mâle de chevêchette d'Europe (cf rapport précédent) est toujours présent sur le site.

Coordination : Romain RIOLS (LPO Auvergne)

• Massifs auvergnats (hors Chaîne des Puys)

Le massif des Bois noirs et les Monts de la Madeleine (au nord des Monts du Forez, en limites 42 – 63 – 03) ont fait l'objet de prospections répétées pour la chouette de Tengmalm : pas de chanteurs entendus mais 2 individus ont été notés sur une commune de l'Allier.
Les Monts de la Margeride (43 -15) n'ont été visités que par un observateur qui a entendu 2 chanteurs sur le versant cantalien.
Dans la Haute-Loire, des recherches sur plusieurs massifs ont fourni un chanteur dans le Meygal, où elle n'était pas connue et un chanteur dans les Monts Breysse, au sud du département.
Dans les Monts du Devès, un chanteur était signalé au nord (région de Fix-St-Geneys) mais plus au sud, où l'on n'avait jusque-là qu'une donnée d'un chanteur en 1995. Ce sont 4 chanteurs, puis 3 femelles au nid qui ont été découverts. Deux nids semblent avoir été abandonnés, le résultat du dernier n'a pu être précisé.
Dans les Monts du Livradois, 3 chanteurs ont été notés sur des sites où elle avait été signalée dans le passé. Plus au sud, dans la partie régulièrement suivie (départements 43 – 63), des chants ont été entendus du 04/01 au 29/05. Comme en 2010, aucune tentative de reproduction n'a été trouvée sur la moitié sud, mis à part un nid tardif, qui n'a semble-t-il produit qu'un jeune, envolé le 18 ou 19 août. Plus au nord, 11 nids ont été trouvés, avec un prédaté (femelle et œufs) par une Martre et 5 abandonnés sans signe de prédation. Quatre ont produit 2 jeunes et le dernier 3 jeunes.
Par ailleurs 2011 nous fournit les premières données de chevêchette d'Europe pour la Haute-Loire et pour le Livradois :

un chanteur noté le 17 mai sur un site, sans suite, puis 2 autres chanteurs, bien cantonnés sur un autre site, à 3,6 km du premier, entendus régulièrement du 24/05 au 12/07. Après sa découverte en 2006 dans la Chaîne des Puys, à quelques 75 km au nord-ouest, son apparition dans le Haut-Livradois n'est pas très surprenante.

Coordination : Dominique VIGIER

• Montagne Limousine (87)

2011 a été une petite année. Pour la zone prospectée depuis le début du suivi, seulement une femelle de chouette de Tengmalm a été observée à la loge, sans jeune à l'envol. Néanmoins un point positif, à 20 km au sud du plateau de Millevaches, toujours en Corrèze, sur les plateaux coupés très boisés en feuillus entre 550 et 700 m, un mâle chanteur a été contacté puis la femelle a été vue à la loge. Même si la reproduction a échoué, cette nouvelle observation en dehors des secteurs prospectés classiquement laisse penser à une présence plus étendue de la chouette de Tengmalm sur les territoires fortement boisés en Limousin.

Coordination : Romain ROUAUD (PIC NOIR)

• Gard et Lozère (30 – 48)

Dans la zone cœur du Parc des Cévennes

Sur l'Aigoual, la pression d'écoute a été à peu près identique aux années précédentes ; le résultat, relativement faible (7 chanteurs de chouette de Tengmalm), est à mettre en relation avec le niveau particulièrement réduit de la production de faines par les hêtres cette année encore. Un seul nid a été trouvé avec reproduction avortée probable. Sur les Causses, la pression d'écoute a été moindre que les 2 années précédentes : pas de recherche dans ce secteur où elle a été entendue précédemment. Sur le haut des vallées cévenoles, pas de contact malgré une pression d'écoute un peu plus structurée que les années précédentes. Sur le Mont Lozère, un contact unique pour 2011. Il ne fait guère de doute que la population du Mont Lozère est probablement plus importante qu'il n'y parait jusqu'à présent.

Hors zone cœur du Parc des Cévennes

Pour le reste de la Lozère, la conclusion est identique à celle du Mont Lozère, avec un seul mâle chanteur de chouette de Tengmalm entendu le 8 avril (tardif, donc peut-être non reproducteur) sur le causse de Sauveterre, dans une pinède de pin maritime. Les secteurs de chant ne semblent pas encore stabilisés dans cette partie du site.

En conclusion, le suivi sur la bordure sud-est Massif central est encore très imparfait et se poursuivra les années suivantes. Il semble que 2011 constitue une mauvaise année pour la reproduction de la Tengmalm, avec peu de chanteurs (9). La faible faînée des hêtres nous semble constituer la principale explication (mauvaise persistance hivernale des populations de mulots et campagnols roussâtres).

Coordination : Jean SEON (Parc National des Cévennes) et François Legendre (ALEPE)

MASSIF ALPIN

• Haute-Savoie (74)

Un peu moins de 200 sorties de prospection réalisée sur la période concernée ont permis 91 contacts avec la chevêchette d'Europe répartis sur 69 sites dont 60 au printemps distribués sur 55 localités. Les mentions printanières sont comprises entre 1 048 et 1 623 m d'altitude. La reproduction est certaine sur 6 sites. La poursuite de la détermination de la répartition de l'espèce en Haute-Savoie progresse et atteint aujourd'hui 123 localités connues dont 89 durant la période de reproduction. La répartition de l'espèce commence à être bien connue mais il persiste encore des secteurs potentiels non explorés comme la partie est du massif du Haut Chablais.

Sur la période concernée, une seule sortie de prospection ciblée sur la chouette de Tengmalm a permis un contact. Les autres mentions, récoltées au hasard, sont réparties sur 6 sites dont 5 au printemps distribués sur 5 localités. Les mentions printanières sont comprises entre 843 et 1 466 m d'altitude. La reproduction est

Bilan de la surveillance de la Chevêchette d'Europe - 2011

RÉGIONS	Nbre de chanteurs ou de couples	Nbre de nids contrôlés ou de familles observées
Vosges du Nord (Moselle et Bas-Rhin)	8	2
Vosges moyennes (Moselle et Bas-Rhin)	2	0
Hautes-Vosges (Haut-Rhin et Vosges)	16	0
Jura (Franche-Comté)	24	1 famille
Jura (Ain)	9	1
Chaîne des Puys	1	0
Livradois	3	0
Haute-Savoie	55	6
Savoie	27-29	0
Isère	66	1
Vercors (Drôme)	8	5
Alpes du Sud (04 et 05)	5	1
Alpes-Maritimes	4	2
TOTAL	**228-230** chanteurs ou couples ou couples ou nidifications	**18** nids **1** famille

Bilan de la surveillance de la Chouette de Tengmalm - 2011

RÉGIONS	Nbre de chanteurs ou de couples	Nbre de nids contrôlés ou de familles observées
Ardennes	17	2
Vosges du Nord (Moselle et Bas-Rhin)	2	0
Vosges moyennes (Moselle et Bas-Rhin)	5	2
Hautes-Vosges (Haut-Rhin et Vosges)	6	1
Jura (Alsace)	1	0
Jura (Franche-Comté)	15	1
Jura (Ain)	3	0
Bourgogne	0	0
Massifs forestiers de Loire	9	0
Montagne limousine (Haute-Vienne)	2	2
Chaîne des Puys	2	0
Massifs auvergnats (43 et 63) et hors chaîne des Puys	22	15
Gard et Lozère	9	1
Haute-Savoie	5	0
Savoie	7	0
Isère	15	1
Vercors (Drôme)	1	1
Alpes du Sud	9	0
Alpes-Maritimes	7	1 + 1 famille
Pyrénées-Atlantiques	22	0
Aude	0	0
Ariège	4	
TOTAL	**163** chanteurs ou couples ou nidifications	**27** nids **1** famille

certaine sur un site. La poursuite de la détermination de la répartition de l'espèce en Haute-Savoie progresse lentement et atteint aujourd'hui 128 localités connues dont 94 durant la période de reproduction. Il persiste encore de nombreux secteurs potentiels répartis sur tout le département. Notons un oiseau recueilli affaibli dans la cour d'un lycée à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman…

Coordination : David REY & PASCAL CHARRIÈRE (LPO Haute-Savoie)

• Savoie (73)

En raison du peu de recherches consacrées à la chouette de Tengmalm, le printemps 2011 n'a pas permis de recenser un grand nombre d'individus chanteurs. Les prospections menées par l'ONF et les données récoltées par les gardes du Parc national de la Vanoise ont cependant permis d'identifier 7 mâles chanteurs répartis sur 3 massifs (Chartreuse/Epine, Maurienne et Tarentaise). Les contacts ont eu lieu entre 850 m et 1 520 m d'altitude.

Une convention d'échange de données passée entre la LPO Savoie et le Parc de la Vanoise sur la période « atlas » ainsi que l'intégration des données de l'ONF ont permis d'ajouter de nombreuses nouvelles localités concernant la chevêchette d'Europe et d'améliorer considérablement les connaissances sur l'espèce dans le département : 27 à 29 chanteurs ont été localisés cette année dans le département.

Coordination : Jérémie HAHN

• Isère (38)

Une vingtaine de naturalistes, agents forestiers et photographes ont prospecté les massifs montagneux de Chartreuse, Vercors, Belledonne et Oisans du département.

27 données de chouette de Tengmalm ont été enregistrées sur Faune-Isère. Elles permettent de localiser 13 territoires, alors que les 179 données de chevêchette d'Europe concernent 64 territoires.

Il faut rajouter, pour le Vercors isérois, deux chanteurs de chouette de Tengmalm (la cavité occupée l'an passée l'est à nouveau cette année) et 2 chanteurs de chevêchette d'Europe (un nid découvert).

Coordination : Yvan ORRECHIONI (ONF), Alain PROVOST (LPO Isère)

• Vercors (26)

Le suivi a été effectué dans la Réserve biologique intégrale de Saint Agnan en Vercors (26) et les milieux contigus de la Réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors.

Cette prospection de 2011 a mis en évidence la stabilité des effectifs de chevêchette d'Europe : 7 couples ont été localisés et un mâle chanteur célibataire. Cinq nidifications ont été suivies : 4 d'entre elles échouent et la 5e produit 3 jeunes. Cette mauvaise reproduction semble liée à l'effondrement de la population de campagnol roussâtre.

Peu de chanteurs de chouette de Tengmalm ont été entendus et un seul nid a été découvert au printemps 2011 avec 2 jeunes.

Coordination : Gilles TROCHARD

Chouette de Tengmalm. © Christophe Sidamon-Pesson

• Alpes du Sud : Alpes-de-Haute-Provence (04) et Hautes-Alpes (05)

Le nombre total de sites où la chevêchette d'Europe a été contactée depuis les années 1980 s'élève désormais à 80 dans les Alpes du Sud (Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence), soit 10 sites supplémentaires trouvés en 2011.

Dans les Alpes de Haute-Provence, 3 nouveaux sites ont été trouvés, uniquement à l'automne. Dans les Hautes-Alpes, 21 sites ont été prospectés, dont 6 sites au printemps (un nouveau site dans l'Embrunais) et 17 sites à l'automne (7 nouveaux sites : 3 dans le Briançonnais, 1 dans le Champsaur-Valgaudemar, 2 dans l'Embrunais et 1 dans le Queyras). Une seule reproduction a été observée, dans l'Embrunais (3 jeunes à l'envol).

Le nombre total de sites où la chouette de Tengmalm a été notée depuis les années 1980 s'élève à 106, soit 7 sites supplémentaires trouvés en 2011 (4 au printemps et 3 à l'automne 2011). Aucune observation dans le Vaucluse, mais en revanche, un nouveau site trouvé à l'automne dans les Alpes de Haute-Provence. Dans les Hautes-Alpes, l'espèce a été contactée dans 14 sites en 2011, avec 6 nouveaux sites découverts, dont 4 au printemps (2 dans le Champsaur-Valgaudemar, 1 dans l'Embrunais et 1 dans le Queyras) et deux à l'automne (dans le Guillestrois). Aucune reproduction n'a été découverte en 2011.

Coordination : Philippe GILLOT (CRAVE)

• Alpes-Maritimes (06)

Quatre chanteurs de chevêchette d'Europe ont été entendus au printemps 2011 dans le massif du Mercantour : dans le Haut-Var (1), dans le Haut-Cian (2 nidifications suivies avec au moins 4 jeunes à l'envol) et dans la vallée de la Roya (1 chanteur).

La chouette de Tengmalm a été contactée sur 5 sites du massif du Mercantour (7 territoires occupés avec une nidification suivie et une famille observée).

Coordination : Boris Guérin (ONF)

PYRÉNÉES

• Pyrénées-Atlantiques (64)

Huit chanteurs de chouette de Tengmalm ont été contactés dans la vallée d'Aspe et 14 dans la vallée d'Ossau entre le 25 janvier et le 20 mai 2011.

Coordination : Jean-Claude AURIA (ONF)

• Aude (11)

Les 7 sorties consacrées à la recherche de la chouette de Tengmalm dans le département n'ont pas connu de succès : aucun chanteur n'a été entendu.

Aucun contact non plus avec la chevêchette d'Europe.

Coordination : Christian RIOLS (LPO Aude)

• Ariège (09)

Trois mâles chanteurs de chouette de Tengmalm ont été entendus au mois de mars et un individu a été observé en plein jour.

Coordination : Boris BAILLAT (Ariège Nature)